



Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

November 2021

Jaarrapportage 2020 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

Bijlagen

| | | |
|------------------------------------|---|----|
| Bijlage 1 | Definities van gebruikte begrippen | 2 |
| Cijfers jaarrapportage wafz 2020 4 | | |
| Bijlage 2 | Aantal zwangerschapsafbrekingen naar woonland cliënt en aantal apart opgegeven overtijdbehandelingen 1980 – 2020 | 5 |
| Bijlage 3 | Abortuscijfer en abortusratio 1990-2020 | 7 |
| Bijlage 4 | Kenmerken vrouw: zwangerschapsduur; leeftijd; aantal kinderen waarvoor zij zorg draagt; aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen | 8 |
| Bijlage 5 | Toegankelijkheid: woonplaats cliënt naar provincie; aantal wafz-vergunningen voor ziekenhuizen en abortusklinieken; zwangerschapsafbrekingen naar provincie, trimester, ziekenhuis of abortuskliniek, 2018 - 2020 | 11 |
| Bijlage 6 | Besluitvorming: verwijspatroon; overleg deskundigen; beraadtermijn in dagen | 14 |
| Bijlage 7 | Behandeling: behandelmethode; gebruik van anesthesie; complicaties | 16 |
| Bijlage 8 | Nazorg: nacontrole; anticonceptiekeuze na behandeling | 19 |

De belangrijkste begrippen met betrekking tot de abortushulpverlening gebruikt in deze rapportage worden hier in alfabetische volgorde toegelicht. Begrippen binnen een definitie die elders in de definitielijst staan beschreven, zijn aangegeven met een *.

Abortuscijfer

Het abortuscijfer (*abortion rate*) wordt internationaal gedefinieerd als het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot en met 44 jaar).

Abortusratio

De abortusratio (*abortion ratio*) kent internationaal twee verschillende definities:

- het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 levend geboren kinderen in het betreffende jaar;
- het aantal zwangerschapsafbrekingen per 100 zwangerschappen (exclusief spontane abortus).

Omdat voor de tweede definitie een aantal aannames moet worden gedaan met betrekking tot aantal spontane zwangerschapsafbrekingen en definiëring heeft de eerste definitie de voorkeur.

Abortuspil

De 'abortuspil' uit het spraakgebruik is in werkelijkheid een behandeling met twee verschillende medicijnen. De eerste medicatie (de feitelijke abortuspil) wordt in abortuskliniek of ziekenhuis ingenomen; de tweede medicatie na 36 tot 48 uur thuis of in de instelling. Na twee tot drie weken volgt een nacontrole. De abortuspil is in Nederland geregistreerd tot negen weken amenorroeduur* en kan dus zowel bij de overtijdbehandeling* als bij een latere zwangerschapsafbreking als behandelingsmethode worden gekozen. De abortuspil is niet hetzelfde als de morning-afterpil*. In ziekenhuizen wordt de abortuspil ook off label gebruikt na de zwangerschapsduur van 8 weken en 6 dagen.

Amenorroeduur

De periode verstreken sinds de eerste dag van de laatste menstruatie.

Beraadtermijn

Een zwangerschap mag niet eerder worden afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw een arts heeft bezocht en daarbij haar voornemen met de arts heeft besproken (Wafz, artikel 3 lid 1). De beraadtermijn geldt niet voor de overtijdbehandeling*.

Besluit afbreking zwangerschap (Bafz)

Algemene Maatregel van Bestuur waarin voorschriften zijn opgenomen voor de uitvoering van de Wet afbreking zwangerschap*.

Eerste trimester zwangerschapsafbreking

Zwangerschapsafbreking tot en met een amenorroeduur van 12 weken en 6 dagen*.

Abortusklinieken en ziekenhuizen met een Wafz-vergunning kunnen, met inachtneming van de beraadtermijn* eerste trimester zwangerschapsafbrekingen uitvoeren.

Late zwangerschapsafbreking

Afbreking van de zwangerschap vanaf 24 weken amenorroeduur*. Deze afbrekingen worden gemeld en beoordeeld binnen de Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen (LZALP) www.lzalp.nl.

Morning-aftermethoden

De morning-afterpil (werkzaam bij inname tot uiterlijk 72 uur na onbeschermd geslachtsgemeenschap) veroorzaakt uitstel of blokkering van de eisprong en innesteling en voorkomt daarmee conceptie. De morning-afterpil is sinds 2004 zonder recept verkrijgbaar bij apotheek en drogist.

De morning-afterspiraal (tot uiterlijk 5 dagen na onbeschermd geslachtsgemeenschap) voorkomt innesteling van een bevruchte eikel in de baarmoeder.

Deze morning-aftermethoden vallen *niet* onder de Wafz (Wafz, artikel 1 lid 2) en zijn niet in de abortusregistratie opgenomen.

De morning-afterpil wordt vaak met 'abortuspil'* en 'overtijdbehandeling'* verward.

Overtijdbehandeling (otb)

Vroege zwangerschapsafbreking, tot 16 dagen 'overtijd' (amenorroeduur* 44 dagen), instrumenteel of met abortuspil*. Indertijd, bij het ontwerpen van de Wafz, kon in deze 'overtijdperiode' een zwangerschap nog niet met zekerheid worden vastgesteld, waardoor onbekend bleef of een zogeheten overtijdbehandeling (ook wel 'menstruatierегeling' genoemd) daadwerkelijk een zwangerschap afbrak. De overtijdbehandeling valt daarom niet onder de Wafz en kent daardoor geen verplichte beraadtermijn*.

Een overtijdbehandeling mag alleen in een ziekenhuis of abortuskliniek met Wafz-vergunning worden verricht.

Niet te verwarren met 'morning-aftermethoden'*.

Tweede trimesterzwangerschapsafbreking

Zwangerschapsafbreking vanaf een amenorroeduur* van 13 weken en 0 dagen tot aan de levensvatbaarheidsgrens. Voor het verrichten van tweede trimesterzwangerschapsafbrekingen stellen de Wafz en het Bafz extra eisen aan de abortusklinieken, die daarvoor een aparte vergunning moeten hebben.

Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

De Wet afbreking zwangerschap, 'houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap' werd in 1981 door de Eerste Kamer aangenomen en trad in 1984 in werking.

Cijfers jaarrapportage Wafz 2020

Methode

Ziekenhuizen en abortusklinieken met een Wafz-vergunning moeten conform de Wafz ieder kwartaal gegevens aanleveren aan de inspectie over de bij hen verrichte zwangerschapsafbrekingen. De gegevens worden geanonimiseerd en geaggregeerd, volgens een Modelformulier, elektronisch aangeleverd. De inspectie brengt alle aangeleverde gegevens samen in een database en maakt op basis daarvan analyses. Ieder jaar brengt de inspectie daarover een jaarrapportage uit, in 2020 is dat voor het eerst een factsheet en deze aparte bijlage met definities en cijfers.

Indien relevant geeft dit rapport over 2020 een vergelijking met de gegevens uit 2018 en 2019 en/of met de gegevens van de voorgaande vijfjaarsperioden.^{1,2}

Gezien de wettelijke bepalingen leveren de instellingen alleen geaggregeerde gegevens aan. Daardoor is het niet mogelijk om correlaties te leggen tussen de verschillende onderdelen van de registratie en worden in dit rapport alleen de 'rechte tellingen' weergegeven.

De gerapporteerde gegevens betreffen de periode 1 januari tot en met 31 december 2020.

1 Voor meer informatie over voorgaande jaren: de jaarrapportages zijn op www.igj.nl gepubliceerd.

2 Het Modelformulier waarmee de gegevens worden aangeleverd, is per 1 januari 2011 op onderdelen gewijzigd. Daarbij zijn definities aangescherpt en is met betrekking tot de zorginhoud een aantal items toegevoegd of uitgebreid. Daardoor is vergelijking met de jaren voor 2011 niet op alle onderdelen mogelijk.

Bijlage 2

Aantal zwangerschapsafbrekingen naar woonland cliënt,
en aantal apart opgegeven overtijdbehandelingen
1980 – 2020

Tabel A

Aantal zwangerschapsafbrekingen naar herkomst cliënten, uitgesplitst naar woonland, in aantallen, in de periode 1980-2018

| Land van vestiging | 1980* | 1985** | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009‡ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nederland | 19.700 | 17.251 | 18.384 | 20.932 | 27.205 | 28.738 | 28.319 | 26.916 | 26.482 | 27.028 | 27.620 | 28.949 | 28.532 |
| België/ (Luxemburg) | 7.100 | 5.044 | 3.524 | 2.247 | 1.473 | 913 | 803 | 530 | 527 | 472 | 444 | 428 | 330 |
| Duitsland ¹ | 26.200 | 8.297 | 6.517 | 2.982 | 1.603 | 1.148 | 1.123 | 1.146 | 1.190 | 1.219 | 1.237 | 1.247 | 1.125 |
| Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.348 | 1.114 | 967 | 810 | 744 | 590 |
| Ierland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 22 | 34 | 18 | 17 | 9 |
| Polen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227 | 242 | 255 | 248 | 266 | 308 |
| Spanje ² | -- | 6.344 | 313 | 242 | 7 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Overige landen | 3.400 | 966 | 1.498 | 2.236 | 3.038 | 2.167 | 2.111 | 597 | 554 | 535 | 613 | 569 | 456 |
| Onbekend | -- | 40 | 6 | 46 | 9 | 4 | 53 | 5 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| Totaal | 56.400 | 37.972 | 30.242 | 28.685 | 33.335 | 32.982 | 32.427 | 30.803 | 30.144 | 30.523 | 31.002 | 32.233 | 31.364 |

* 1980: Bron Stimezo Nederland 1984 (door Stimezo geregistreerde aantallen van de abortusklinieken en de geschatte aantallen van de ziekenhuizen)

** vanaf 1985: Uit wettelijk verplichte abortusregistratie (inclusief apart opgegeven overtijdbehandelingen, zie hoofdstuk 3.3)

‡ Voor gebruik gegevens 2009 in plaats van 2010: zie hoofdstuk 1.3.

1. Tot 1990: West-Duitsland

2. In de – in 1984 wettelijk vastgestelde – registratieformulieren werden Duitsland, België/Luxemburg en Spanje gespecificeerd. Dit waren destijds de meest voorkomende landen. In de registratieformulieren die per 1 januari 2011 van kracht werden wordt België apart genoemd, zijn Frankrijk, Ierland en Polen toegevoegd en zijn Luxemburg en Spanje als aparte categorie afgevallen.

Tabel B

Aantal apart geregistreerde overtijdbehandelingen binnen totaal aantal zwangerschapsafbrekingen, in de periode 1990-2020

| | Aantal overtijdbehandelingen | Percentage overtijdbehandelingen binnen totaal aantal zwangerschapsafbrekingen % |
|-------|-------------------------------------|---|
| 1990 | 3.485 | 11,5 |
| 1995 | 3.498 | 12,2 |
| 2000 | 6.005 | 18,0 |
| 2005 | 6.311 | 19,1 |
| 2009* | 7.652 | 23,6 |
| 2014 | 8.229 | 27,1 |
| 2015 | 8.553 | 27,8 |
| 2016 | 8.191 | 27,2 |
| 2017 | 7.590 | 24,9 |
| 2018 | 7.536 | 24,3 |
| 2019 | 9.186 | 28,5 |
| 2020 | 9.903 | 31,6 |

* Door het faillissement van een abortuskliniek in 2010 moesten de data voor 2010 deels worden geschat. Daarom worden hier de data van 2009 getoond.

Bijlage 3 Abortuscijfer en abortusratio 1990-2020

Tabel C

Abortuscijfer: Aantal zwangerschapsafbrekingen (inclusief overtijdbehandelingen) per 1.000 vrouwen van 15 tot 44 jaar in Nederland woonachtig*, in de periode 1990-2020

| | Aantal in Nederland wonende behandelde vrouwen | Abortuscijfer per 1.000 in Nederland wonende vrouwen |
|-------|---|---|
| 1990 | 18.384 | 5,2 |
| 1995 | 20.932 | 6,0 |
| 2000 | 27.205 | 8,0 |
| 2005 | 28.738 | 8,6 |
| 2010† | 26.724 | 8,7 |
| 2015 | 26.916 | 8,6 |
| 2016 | 26.482 | 8,5 |
| 2017 | 27.028 | 8,6 |
| 2018 | 27.620 | 8,8 |
| 2019 | 28.949 | 9,1 |
| 2020 | 28.532 | 8,9 |

* Gebaseerd op het aantal vrouwen 15-44 jaar volgens opgave Centraal Bureau voor de statistiek (van 1990 t/m 1995 gemiddeld over het jaar; van 1996 t/m 2009 op basis van peildatum 1 januari van het betreffende jaar, vanaf 2010 gemiddeld over het jaar).

† Gebaseerd op geschatte gegevens

Tabel D

Abortusratio: Aantal zwangerschapsafbrekingen (inclusief overtijdbehandelingen) per 1.000 levendgeborenen in de periode 1990-2020

| | |
|-------|-----|
| 1990 | 93 |
| 1995 | 110 |
| 2000 | 132 |
| 2005 | 153 |
| 2010† | 152 |
| 2015 | 158 |
| 2016 | 154 |
| 2017 | 159 |
| 2018 | 164 |
| 2019 | 171 |
| 2020 | 169 |

† Gebaseerd op geschatte gegevens

Bijlage 4

Kenmerken vrouw:

Zwangerschapsduur; leeftijd; aantal kinderen waarvoor zij zorg draagt; aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen

Tabel E

Zwangerschapsduur ten tijde van de afbreking in aantallen, naar ziekenhuis of kliniek, 2018 - 2020

| | Ziekenhuizen | | | Klinieken (inclusief overtijdbehandelingen) | | | Totaal | | |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | <i>2018</i> | <i>2019</i> | 2020 | <i>2018</i> | <i>2019</i> | 2020 | <i>2018</i> | <i>2019</i> | 2020 |
| 4 weken | 71 | 67 | 97 | 925 | 1.165 | 1.586 | 996 | 1.232 | 1.683 |
| 5 weken | 475 | 474 | 400 | 4.461 | 5.540 | 5.956 | 4.936 | 6.014 | 6.356 |
| 6 weken | 503 | 562 | 501 | 6.029 | 7.057 | 7.734 | 6.532 | 7.619 | 8.235 |
| 7 weken | 431 | 407 | 346 | 4.101 | 3.659 | 3.361 | 4.532 | 4.066 | 3.707 |
| 8 weken | 281 | 259 | 174 | 3.318 | 3.148 | 2.787 | 3.599 | 3.407 | 2.961 |
| 9 weken | 119 | 154 | 98 | 2.076 | 1.964 | 1.575 | 2.195 | 2.118 | 1.673 |
| 10 weken | 71 | 97 | 65 | 1.093 | 1.057 | 828 | 1.164 | 1.154 | 893 |
| 11 weken | 69 | 53 | 50 | 850 | 733 | 610 | 919 | 786 | 660 |
| 12 weken | 77 | 79 | 100 | 596 | 529 | 406 | 673 | 608 | 506 |
| 13 weken | 123 | 115 | 123 | 406 | 487 | 393 | 529 | 602 | 516 |
| 14 weken | 123 | 129 | 166 | 481 | 460 | 367 | 604 | 589 | 533 |
| 15 weken | 72 | 79 | 112 | 530 | 511 | 459 | 602 | 590 | 571 |
| 16 weken | 70 | 75 | 82 | 564 | 560 | 485 | 634 | 635 | 567 |
| 17 weken | 94 | 92 | 81 | 473 | 410 | 351 | 567 | 502 | 432 |
| 18 weken | 53 | 44 | 48 | 495 | 425 | 366 | 548 | 469 | 414 |
| 19 weken | 40 | 32 | 36 | 470 | 416 | 337 | 510 | 448 | 373 |
| 20 weken | 54 | 88 | 111 | 432 | 420 | 315 | 486 | 508 | 426 |
| 21 weken | 114 | 123 | 137 | 368 | 344 | 301 | 482 | 467 | 438 |
| 22 weken | 133 | 101 | 110 | 181 | 170 | 161 | 314 | 271 | 271 |
| 23 weken | 166 | 140 | 130 | 0 | 0 | 0 | 166 | 140 | 130 |
| Niet ingevuld | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 19 |
| Totaal | 3.153 | 3.178 | 2.981 | 27.840 | 29.055 | 28.383 | 31.002 | 32.233 | 31.364 |

Tabel F

Leeftijd van de vrouw bij de behandeling in aantallen, 2018 – 2020

| | 2018 | 2019 | 2020 | 'abortuscijfer' per leeftijds- categorie 2020 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| < 15 jaar | 49 | 70 | 58 | |
| 15 t/m 19 jaar | 2.471 | 2.583 | 2.297 | 4,52 |
| 20 t/m 24 jaar | 6.627 | 6.645 | 6.135 | 11,33 |
| 25 t/m 29 jaar | 7.664 | 7.863 | 7.688 | 13,76 |
| 30 t/m 34 jaar | 6.959 | 7.340 | 7.294 | 13,24 |
| 35 t/m 39 jaar | 4.948 | 5.378 | 5.410 | 10,36 |
| 40 t/m 44 jaar | 2.032 | 2.128 | 2.231 | 4,33 |
| ≥ 45 jaar | 248 | 221 | 242 | |
| <i>Niet ingevuld</i> | 4 | 5 | 9 | |
| Totaal | 31.002 | 32.233 | 31.364 | |

Tabel G

Aantal kinderen dat de vrouw heeft gekregen en/of waarvoor de vrouw zorg draagt in percentages van het totaal aantal behandelde vrouwen, 2018 - 2020

| | 2018 (n=31.002) % | 2019 (n = 32.233) % | 2020 (n = 31.364) % |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 0 | 46,6 | 46,6 | 46,3 |
| 1 | 20,4 | 20,1 | 19,6 |
| 2 | 20,9 | 21,2 | 21,6 |
| 3 | 8,5 | 8,4 | 8,6 |
| 4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| 6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| > 6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Tabel H

Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen, in percentages van behandelde vrouwen, 2018 - 2020

| | 2018 (n=31.002) % | 2019 (n = 32.233) % | 2020 (n = 31.364) % |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0 | 64,6 | 65,4 | 65,4 |
| 1 | 25,4 | 24,5 | 23,5 |
| 2 | 6,7 | 6,5 | 6,9 |
| 3 | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
| 4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| > 5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Niet ingevuld | 0,2 | 0,1 | 0,4 |

Bijlage 5

Toegankelijkheid:

Woonplaats cliënt naar provincie; aantal Wafz-vergunningen voorziekenhuizen en abortusklinieken; zwangerschapsafbrekingen naar provincie, trimester, ziekenhuis of abortuskliniek, 2018 - 2020

Tabel I

Woonplaats cliënten naar provincie, in percentages van behandelde vrouwen die in Nederland woonachtig waren, 2018 - 2020

| | 2018 (n = 27.620) | 2019 (n = 28.949) | 2020 (n = 28.532) | Abortuscijfer per provincie 2020 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Groningen | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 8,5 |
| Friesland | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 6,0 |
| Drenthe | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 4,9 |
| Overijssel | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 6,4 |
| Gelderland | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 6,4 |
| Flevoland | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 13,8 |
| Utrecht | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 7,3 |
| Noord-Holland | 23,1 | 23,0 | 22,3 | 11,3 |
| Zuid-Holland | 28,6 | 29,8 | 29,0 | 11,6 |
| Zeeland | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 4,1 |
| Noord-Brabant | 11,9 | 11,6 | 12,3 | 7,7 |
| Limburg | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 7,5 |

Tabel J

Aantal Wafz-vergunningen voor ziekenhuizen en abortusklinieken (of ZBC) naar provincie op 31 december 2020

| | Ziekenhuizen | Klinieken | Totaal |
|---------------------|--------------|----------------|--------|
| Groningen | 4 | 1 | 5 |
| Friesland | 4 | -- | 4 |
| Drenthe | 3 | -- | 3 |
| Overijssel | 5 | 2 | 7 |
| Gelderland | 10 | 1 | 11 |
| Flevoland | 1 | 1 | 2 |
| Utrecht | 4 | 1 | 5 |
| Noord-Holland | 14 | 6 ⁺ | 20 |
| Zuid-Holland | 16 | 2 | 18 |
| Zeeland | 2 | 1 | 3 |
| Noord-Brabant | 10 | 3 | 13 |
| Limburg | 5 | 1 | 6 |
| Caribisch Nederland | 1 | -- | 1 |
| Totaal | 79 | 19 | 98 |

* Daarnaast heeft Women on Waves voor haar zeiljacht 'Adelaide' een vergunning in het kader van de Wafz.

-- Geen abortuskliniek aanwezig

Tabel K

Aandeel in tweede trimester behandelingen, naar ziekenhuizen en abortusklinieken,

2011-2020*

| | <i>Ziekenhuizen</i> | | <i>abortusklinieken</i> | | Totaal aantal |
|------|---------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|
| | Aantal | % van totaal tweede trimesterabortus | Aantal | % van totaal tweede trimesterabortus | |
| 2011 | 813 | 13,0 | 5.422 | 87,0 | 6.235 |
| 2012 | 787 | 13,6 | 5.013 | 86,4 | 5.800 |
| 2013 | 842 | 14,6 | 4.927 | 85,4 | 5.769 |
| 2014 | 892 | 16,0 | 4.693 | 84,0 | 5.585 |
| 2015 | 924 | 16,1 | 4.807 | 83,9 | 5.731 |
| 2016 | 867 | 15,7 | 4.671 | 84,3 | 5.538 |
| 2017 | 1.034 | 18,7 | 4.495 | 81,3 | 5.529 |
| 2018 | 1.047 | 19,2 | 4.400 | 80,3 | 5.447 |
| 2019 | 1.022 | 19,6 | 4.203 | 80,4 | 5.225 |
| 2020 | 1.142 | 24,4 | 3.534 | 75,6 | 4.676 |

* In 2011 is de definitie van de termijnen aangescherpt.

Tabel L

Aantal zwangerschapsafbrekingen 2020 per provincie, naar ziekenhuis of abortuskliniek, met vermelding van aantal tweede trimesterabortussen en apart opgegeven overtijdbehandelingen

| Provincie | Ziekenhuizen | | abortusklinieken | | | Totaal | |
|------------------|---------------------|--|-------------------------|--|------------------------|---------------|--|
| | Totaal | Waarvan 2^e trimester | Totaal | Waarvan 2^e trimester | Waarvan otb | Totaal | Waarvan 2^e trimester |
| Groningen | 33 | 20 | 1.353 | 0 | 852 | 1.386 | 20 |
| Friesland | 115 | 18 | -- | -- | -- | 115 | 18 |
| Drenthe | 51 | 12 | -- | -- | -- | 51 | 12 |
| Overijssel | 105 | 97 | 1.929 | 0 | 678 | 2.034 | 97 |
| Gelderland | 162 | 141 | 1.918 | 134 | 962 | 2.080 | 275 |
| Flevoland | 506 | 5 | 1.203 | 0 | 0 | 1.709 | 5 |
| Utrecht | 164 | 150 | 3.069 | 1.040 | 0 | 03.233 | 1.190 |
| Noord-Holland | 1.001 | 213 | 6.878 | 1.730 | 3.270 | 7.879 | 1.943 |
| Zuid-Holland | 430 | 259 | 7.033 | 293 | 1.740 | 7.463 | 552 |
| Zeeland | 52 | 2 | 105 | 0 | 0 | 157 | 2 |
| Noord-Brabant | 147 | 125 | 3.631 | 107 | 2.183 | 3.778 | 232 |
| Limburg | 103 | 96 | 1.264 | 230 | 218 | 1.367 | 326 |
| Caribisch gebied | 112 | 4 | -- | -- | -- | 112 | 4 |

-- Geen abortuskliniek aanwezig

Bijlage 6 *Besluitvorming:*
Verwijspatroon; overleg deskundigen; beraadtermijn in dagen

Tabel M

Verwijspatroon, in percentages van behandelde vrouwen, 2020, 2019 en 2018.

| 2020 | Ziekenhuis (n = 2.981) % | Kliniek ex otb (n = 18.480) % | Kliniek otb (n = 9.903) % | Kliniek totaal (n = 28.383) % | Totaal (n = 31.364) % |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|
| Niet verwezen | 15,1 | 29,4 | 56,4 | 38,8 | 36,6 |
| Huisarts | 45,5 | 56,2 | 42,9 | 51,6 | 51,0 |
| A ndere abortuskliniek | 0,5 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 1,1 |
| Arts tweede of derde lijn | 12,2 | 12,1 | 0,5 | 8,0 | 8,4 |
| A ndere verwijzer | 26,5 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 2,9 |
| Niet ingevuld | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2019 | Ziekenhuis (n = 3.178) % | Kliniek ex otb (n = 19.869) % | Kliniek otb (n = 9.186) % | Kliniek totaal (n = 29.055) % | Totaal (n = 32.233) % |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|
| Niet verwezen | 14,2 | 24,8 | 51,0 | 33,1 | 31,2 |
| Huisarts | 53,4 | 59,9 | 47,6 | 56,0 | 55,7 |
| A ndere abortuskliniek | 0,8 | 2,3 | 0,2 | 1,7 | 1,6 |
| Arts tweede of derde lijn | 11,2 | 12,5 | 1,2 | 8,9 | 9,2 |
| A ndere verwijzer | 20,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 2,3 |
| Niet ingevuld | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2018 | Ziekenhuis (n = 3.153) % | Kliniek ex otb (n = 20.313) % | Kliniek otb (n = 7.536) % | Kliniek totaal (n = 27.849) % | Totaal (n = 31.002) % |
|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|
| Niet verwezen | 14,4 | 17,3 | 41,3 | 23,8 | 22,8 |
| Huisarts | 52,0 | 66,1 | 56,9 | 63,6 | 62,4 |
| A ndere abortuskliniek | 0,3 | 2,0 | 0,1 | 1,5 | 1,4 |
| Arts tweede of derde lijn | 9,9 | 13,7 | 1,2 | 10,3 | 10,3 |
| A ndere verwijzer | 22,4 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 3,0 |
| Niet ingevuld | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |

Tabel N

Overleg van de vrouw met andere deskundige naast de verwijzend of behandelend arts, in percentages van behandelde vrouwen, 2020*

| 2020 | Ziekenhuis (n = 2.981) % | Kliniek (n = 28.383) % | Totaal (n = 31.364) % |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Maatschappelijk werker | 14,5 | 0,7 | 2,0 |
| Psycholoog/psychiater | 2,2 | 0,4 | 0,6 |
| Geestelijk raadspersoon | 0,3 | 0,8 | 0,7 |
| Klinisch genetisch centrum | 18,5 | 0,1 | 1,9 |
| (Academisch) perinataal centrum | 13,3 | 0,1 | 1,3 |
| Ander deskundige | 4,9 | 1,0 | 1,4 |
| Geen nader overleg | 63,9 | 96,9 | 93,8 |

* Meerdere antwoorden mogelijk

Tabel O

Aantal dagen beraadtermijn, in percentages van behandelde vrouwen, 2018 - 2020

| | 2018 (n=7.536 + 23.466) | | 2019 (n=9.186 + 23.047) | | 2020 (n=9.903 + 21.461) | |
|----------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | Overtijd- behandeling % | Zwangerschaps- afbrekingen exclotb % | Overtijd- behandeling % | Zwangerschaps- afbrekingen exclotb % | Overtijd- behandeling % | Zwangerschaps- afbrekingen exclotb % |
| 0 dagen | 33,9 | 0,7 | 40,2 | 1,1 | 45,1 | 1,3 |
| 1 dag | 3,0 | 0,6 | 3,2 | 0,5 | 3,6 | 0,6 |
| 2 dagen | 2,4 | 0,4 | 2,8 | 0,4 | 2,4 | 0,6 |
| 3 dagen | 2,7 | 0,2 | 3,0 | 0,4 | 2,7 | 0,4 |
| 4 dagen | 2,7 | 0,4 | 2,6 | 0,6 | 2,5 | 0,6 |
| 5 dagen | 2,4 | 1,1 | 2,6 | 1,6 | 4,3 | 1,8 |
| 6 dagen | 9,6 | 17,1 | 9,7 | 21,1 | 8,6 | 24,8 |
| 7 dagen | 11,7 | 14,1 | 12,0 | 16,6 | 9,7 | 18,5 |
| 8 dagen | 8,3 | 9,2 | 6,4 | 9,9 | 5,8 | 9,8 |
| 9 dagen | 4,6 | 6,0 | 3,5 | 6,2 | 3,6 | 6,4 |
| 10 dagen | 4,1 | 5,5 | 3,1 | 5,4 | 2,4 | 5,7 |
| > 10 dgn | 14,5 | 44,6 | 10,7 | 36,1 | 9,3 | 29,5 |

Bijlage 7

Behandeling:
Behandelmethode; gebruik van anesthesie; complicaties

Tabel P

Behandelmethode, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen en naar ziekenhuis en kliniek 2020, 2019 en 2018

| 2020 | Zieken- huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| Medicamenteus | 2.552 | 85,6 | 2.083 | 11,3 | 5.115 | 51,7 | 7.198 | 25,4 | 9.750 | 31,1 |
| Instrumenteel | 194 | 6,5 | 1.464 | 7,9 | 730 | 7,4 | 2.194 | 7,7 | 2.388 | 7,6 |
| Combinatie (medicamenteuze voorbehandeling) | 207 | 6,9 | 14.933 | 80,8 | 4.058 | 41,0 | 18.991 | 66,9 | 19.198 | 61,2 |
| Anders | 20 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 0,1 |
| Niet ingevuld | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| | 2.981 | | 18.480 | | 9.903 | | 28.383 | | 31.364 | |

| 2019 | Zieken- huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| Medicamenteus | 2.535 | 79,8 | 2.005 | 10,1 | 4.310 | 46,9 | 6.315 | 21,7 | 8.850 | 27,5 |
| Instrumenteel | 309 | 9,7 | 1.661 | 8,4 | 509 | 5,5 | 2.170 | 7,5 | 2.479 | 7,7 |
| Combinatie (medicamenteuze voorbehandeling) | 307 | 9,7 | 16.203 | 81,5 | 4.367 | 47,5 | 20.570 | 70,8 | 20.877 | 64,8 |
| Anders | 22 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 0,1 |
| Niet ingevuld | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| | 3.178 | | 19.869 | | 9.186 | | 29.055 | | 32.233 | |

| 2018 | Zieken- huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| Medicamenteus | 2.490 | 79,0 | 2.043 | 10,1 | 3.632 | 48,2 | 5.675 | 20,4 | 8.165 | 26,3 |
| Instrumenteel | 357 | 11,3 | 1.806 | 8,9 | 508 | 6,7 | 2.314 | 8,3 | 2.671 | 8,6 |
| Combinatie (medicamenteuze voorbehandeling) | 285 | 9,0 | 16.464 | 81,1 | 3.396 | 45,1 | 19.860 | 71,3 | 20.145 | 65,0 |
| Anders | 19 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 19 | 0,1 |
| Niet ingevuld | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| | 3.153 | | 20.313 | | 7.536 | | 27.849 | | 31.002 | |

Tabel Q

Gebruik van anesthesie tijdens de behandeling, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen en naar ziekenhuis en kliniek 2020, 2019 en 2018

| 2020 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---------------|------------|------|---------------------|------|----------------|------|-------------------|------|--------|------|
| Geen | 1.948 | 65,3 | 2.032 | 11,0 | 5.123 | 51,7 | 7.155 | 25,2 | 9.103 | 29,0 |
| Lokaal | 202 | 6,8 | 1.903 | 10,3 | 1.700 | 17,2 | 3.603 | 12,7 | 3.805 | 12,1 |
| Intraveneus | 523 | 17,5 | 14.481 | 78,4 | 3.080 | 31,1 | 17.561 | 61,9 | 18.084 | 57,7 |
| Combinatie | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| Anders † | 200 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 0,6 |
| Niet ingevuld | 100 | 3,4 | 64 | 0,3 | 0 | 0,0 | 64 | 0,2 | 164 | 0,5 |
| Totaal | 2.981 | | 18.480 | | 9.903 | | 28.383 | | 31.364 | |

† Onder andere: algehele narcose; epidurale of spinale anesthesie; PCA pomp

| 2019 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---------------|------------|------|---------------------|------|----------------|------|-------------------|------|--------|------|
| Geen | 1.963 | 61,8 | 1.990 | 10,0 | 4.344 | 47,3 | 6.334 | 21,8 | 8.297 | 25,7 |
| Lokaal | 153 | 4,8 | 2.334 | 11,7 | 1.962 | 21,4 | 4.296 | 14,8 | 4.449 | 1,4 |
| Intraveneus | 665 | 20,9 | 15.468 | 77,8 | 2.879 | 31,3 | 18.347 | 63,1 | 19.012 | 59,0 |
| Combinatie | 7 | 0,2 | 77 | 0,4 | 0 | 0,0 | 77 | 0,3 | 84 | 0,3 |
| Anders † | 236 | 7,4 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 237 | 0,7 |
| Niet ingevuld | 154 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 154 | 0,5 |
| Totaal | 3.178 | | 19.869 | | 9.186 | | 29.055 | | 32.233 | |

† Onder andere: algehele narcose; epidurale of spinale anesthesie; PCA pomp

| 2018 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---------------|------------|------|---------------------|------|----------------|------|-------------------|------|--------|------|
| Geen | 2.004 | 63,6 | 2.097 | 10,3 | 3.651 | 48,4 | 5.748 | 20,6 | 7.752 | 25,0 |
| Lokaal | 157 | 5,0 | 3.315 | 16,3 | 1.724 | 22,9 | 5.039 | 18,1 | 5.196 | 16,8 |
| Intraveneus | 714 | 22,6 | 14.900 | 73,4 | 1.238 | 16,4 | 16.138 | 57,9 | 16.852 | 54,4 |
| Combinatie | 12 | 0,4 | 1 | 0,0 | 923 | 12,2 | 924 | 3,3 | 936 | 3,0 |
| Anders † | 233 | 7,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 233 | 0,8 |
| Niet ingevuld | 33 | 1,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 33 | 0,1 |
| Totaal | 3.153 | | 20.313 | | 7.536 | | 27.849 | | 31.002 | |

† Onder andere: algehele narcose; epidurale of spinale anesthesie; PCA pomp

Tabel R
Complicaties in aantallen* en percentages van behandelde vrouwen, 2020

| 2020 | Zieken- huis | % | Kliniek | % | Kliniek | % | Kliniek | % | totaal | % |
|--|-----------------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| | | | excl otb | | otb | | totaal | | | |
| Geen | 2.447 | 82,1 | 18.336 | 99,2 | 9.747 | 98,4 | 28.083 | 98,9 | 30.530 | 97,3 |
| Behandeld in eigen instelling | 491 | 16,5 | 113 | 0,6 | 149 | 1,5 | 262 | 0,9 | 753 | 2,4 |
| Verwezen naar (ander) ziekenhuis | 5 | 0,2 | 15 | 0,1 | 7 | 0,1 | 22 | 0,1 | 27 | 0,1 |
| Niet ingevuld | 38 | 1,3 | 16 | 0,1 | 0 | 0,0 | 16 | 0,1 | 54 | 0,2 |
| Totaal | 2.981 | 100,0 | 18.480 | 100,0 | 9.903 | 100,0 | 28.383 | 100,0 | 31.364 | 100,0 |
| Indien complicatie is behandeld in eigen instelling * | | | | | | | | | | |
| Bloedverlies > 500 ml | 176 | 29,7 | 8 | 6,7 | 4 | 2,7 | 12 | 4,5 | 188 | 21,8 |
| Incomplete abortus | 305 | 51,5 | 76 | 63,9 | 132 | 88,0 | 208 | 77,3 | 513 | 59,6 |
| Letsel aan uterus | 2 | 0,3 | 8 | 6,7 | 1 | 0,7 | 9 | 3,3 | 11 | 1,3 |
| Infectie | 13 | 2,2 | 6 | 5,0 | 2 | 1,3 | 8 | 3,0 | 21 | 2,4 |
| Bijwerkinge n medicatie | 2 | 0,3 | 9 | 7,6 | 3 | 2,0 | 12 | 4,5 | 14 | 1,6 |
| Andere complicatie † | 94 | 15,9 | 12 | 10,1 | 8 | 5,3 | 20 | 7,4 | 114 | 13,2 |
| Totaal | 592 | | 119 | | 150 | | 269 | | 861 | |

* meerdere complicaties per patiënte mogelijk

† onder andere: zie open vraag 17

Bijlage 8

Nazorg:
 Nacontrole; anticonceptiekeuze na behandeling

Tabel S

Nacontrole, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen, 2020

| 2020 | Zieken- huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| In behandelcentrum | 2.647 | 88,8 | 5.312 | 28,7 | 5.135 | 51,9 | 10.447 | 36,8 | 13.094 | 41,7 |
| Bij verwijzer | 92 | 3,1 | 11.352 | 61,4 | 3.711 | 37,5 | 15.063 | 53,1 | 15.155 | 48,3 |
| Elders | 6 | 0,2 | 1.439 | 7,8 | 697 | 7,0 | 2.136 | 7,5 | 2.142 | 6,8 |
| Geen nacontrole | 204 | 6,8 | 376 | 2,0 | 360 | 3,6 | 736 | 2,6 | 940 | 3,0 |
| Niet ingevuld | 32 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 33 | 0,1 |
| Totaal | 2.981 | | 18.480 | | 9.903 | | 28.383 | | 31.364 | |

Otb: overtijdbehandeling

Nacontrole, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen, 2019

| 2019 | Zieken- huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| In behandelcentrum | 2.803 | 88,2 | 4.913 | 24,7 | 4.452 | 48,5 | 9.365 | 32,2 | 12.168 | 37,8 |
| Bij verwijzer | 42 | 1,3 | 14.295 | 71,9 | 4.345 | 47,3 | 18.640 | 64,2 | 18.682 | 58,0 |
| Elders | 8 | 0,3 | 510 | 2,6 | 258 | 2,8 | 768 | 2,6 | 776 | 2,4 |
| Geen nacontrole | 282 | 8,9 | 149 | 0,7 | 131 | 1,4 | 280 | 1,0 | 562 | 1,7 |
| Niet ingevuld | 43 | 1,4 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 45 | 0,1 |
| Totaal | 3.178 | | 19.869 | | 9.186 | | 29.055 | | 32.233 | |

Nacontrole, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen, 2018

| 2018 | Zieken- huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|--------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| In behandelcentrum | 2.765 | 87,7 | 4.388 | 21,6 | 3.181 | 42,2 | 7.569 | 27,2 | 10.334 | 33,3 |
| Bij verwijzer | 59 | 1,9 | 15.435 | 76,0 | 3.970 | 52,7 | 19.405 | 69,7 | 19.464 | 62,8 |
| Elders | 9 | 0,3 | 287 | 1,4 | 186 | 2,5 | 473 | 1,7 | 482 | 1,6 |
| Geen nacontrole | 241 | 7,6 | 202 | 1,0 | 199 | 2,6 | 401 | 1,4 | 642 | 2,1 |
| Niet ingevuld | 79 | 2,5 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 80 | 0,3 |
| Totaal | 3.153 | | 20.313 | | 7.536 | | 27.849 | | 31.002 | |

Otb: overtijdbehandeling

Tabel T

Anticonceptie na de behandeling, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen, 2020

| 2020 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| A.c. voorgeschreven | 797 | 26,7 | 7.440 | 40,3 | 4.847 | 48,9 | 12.287 | 43,3 | 13.084 | 41,7 |
| Verwezen naar de huisarts | 780 | 26,2 | 10.496 | 56,8 | 4.719 | 47,7 | 15.215 | 53,6 | 15.995 | 51,0 |
| Geen a.c. gewenst | 608 | 20,4 | 470 | 2,5 | 282 | 2,8 | 752 | 2,6 | 1.360 | 4,3 |
| Niet besproken | 653 | 21,9 | 68 | 0,4 | 25 | 0,3 | 93 | 0,3 | 746 | 2,4 |
| Niet ingevuld | 143 | 4,8 | 6 | 0,0 | 30 | 0,3 | 36 | 0,1 | 179 | 0,6 |
| Totaal | 2.981 | | 18.480 | | 9.903 | | 28.383 | | 31.364 | |

Anticonceptie na de behandeling, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen, 2019

| 2019 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| A.c. voorgeschreven | 1.065 | 33,5 | 8.322 | 41,9 | 4.900 | 53,3 | 13.222 | 45,5 | 14.287 | 44,3 |
| Verwezen naar de huisarts | 838 | 26,4 | 10.755 | 54,1 | 3.851 | 41,9 | 14.606 | 50,3 | 15.444 | 47,9 |
| Geen a.c. gewenst | 613 | 19,3 | 531 | 2,7 | 287 | 3,1 | 818 | 2,8 | 1.431 | 4,4 |
| Niet besproken | 546 | 17,2 | 245 | 1,2 | 40 | 0,4 | 285 | 1,0 | 831 | 2,6 |
| Niet ingevuld | 116 | 3,7 | 16 | 0,1 | 108 | 1,2 | 124 | 0,4 | 240 | 0,7 |
| Totaal | 3.178 | | 19.869 | | 9.186 | | 29.055 | | 32.233 | |

Anticonceptie na de behandeling, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen, 2018

| 2018 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------|----------|
| A.c. voorgeschreven | 1.009 | 32,0 | 9.432 | 46,4 | 4.280 | 56,8 | 13.712 | 49,2 | 14.721 | 47,5 |
| Verwezen naar de huisarts | 842 | 26,7 | 10.225 | 50,3 | 2.950 | 39,1 | 13.175 | 47,3 | 14.017 | 45,2 |
| Geen a.c. gewenst | 594 | 18,8 | 577 | 2,8 | 263 | 3,5 | 840 | 3,0 | 1.434 | 4,6 |
| Niet besproken | 600 | 19,0 | 78 | 0,4 | 43 | 0,6 | 121 | 0,4 | 721 | 2,3 |
| Niet ingevuld | 108 | 3,4 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 109 | 0,4 |
| Totaal | 3.153 | | 20.313 | | 7.536 | | 27.849 | | 31.002 | |

www.igj.nl