



Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Bijlage

Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

Oktober 2023

Inhoud

| | |
|--|----|
| Cijfers jaarrapportage Wafz 2022 | 3 |
| Bijlage 1 - Definities van gebruikte begrippen | 4 |
| Bijlage 2 - Aantal zwangerschapsafbrekingen | 6 |
| Bijlage 3 - Abortuscijfer en abortusratio | 8 |
| Bijlage 4 - Kenmerken vrouw | 9 |
| Bijlage 5 - Toegankelijkheid | 12 |
| Bijlage 6 - Besluitvorming | 16 |
| Bijlage 7 - Behandeling | 19 |
| Bijlage 8 - Nazorg | 22 |

Cijfers jaarrapportage Wafz 2022

Methode

Ziekenhuizen en abortusklinieken met een Wafz-vergunning moeten conform de Wafz ieder kwartaal gegevens aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) over de bij hen verrichte zwangerschapsafbrekingen. De gegevens worden door middel van een elektronisch Modelformulier geanonimiseerd en geaggregeerd aangeleverd. De inspectie brengt alle door het veld aangeleverde gegevens samen in een database. Ieder jaar brengt de inspectie daarover een jaarrapportage uit. In 2020 is deze jaarrapportage voor het eerst gesplitst in een factsheet en een aparte bijlage met definities en cijfers.

Indien relevant worden de gegevens over 2022 vergeleken met de gegevens uit 2020 en 2021 en/of met de gegevens van de voorgaande vijfjaarsperioden.^{1,2}

Gezien de wettelijke bepalingen leveren de instellingen alleen geaggregeerde gegevens aan. Daardoor is het niet mogelijk om correlaties te leggen tussen de verschillende onderdelen van de registratie en worden in dit rapport alleen de 'rechte tellingen' weergegeven.

De gerapporteerde gegevens betreffen de periode 1 januari tot en met 31 december 2022.

¹ Voor meer informatie over voorgaande jaren: de jaarrapportages zijn op www.igj.nl gepubliceerd.

² Het Modelformulier waarmee de gegevens worden aangeleverd, is per 1 januari 2011 op onderdelen gewijzigd. Daarbij zijn definities aangescherpt en is met betrekking tot de zorginhoud een aantal items toegevoegd of uitgebreid. Daardoor is vergelijking met de jaren voor 2011 niet op alle onderdelen mogelijk.

Bijlage 1 - Definities van gebruikte begrippen

De belangrijkste begrippen met betrekking tot de abortushulpverlening gebruikt in deze rapportage worden hier in alfabetische volgorde toegelicht. Begrippen binnen een definitie die elders in de definitielijst staan beschreven, zijn aangeven met een *.

Abortuscijfer

Het abortuscijfer (*abortion rate*) wordt internationaal gedefinieerd als het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot en met 44 jaar).

Abortusratio

De abortusratio (*abortion ratio*) kent internationaal twee verschillende definities:

- > het aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 levend geboren kinderen in het betreffende jaar;
- > het aantal zwangerschapsafbrekingen per 100 zwangerschappen (exclusief spontane abortus).

Omdat voor de tweede definitie een aantal aannames moet worden gedaan met betrekking tot aantal spontane zwangerschapsafbrekingen en definiëring heeft de eerste definitie de voorkeur.

Abortuspil

De 'abortuspil' uit het spraakgebruik is in werkelijkheid een behandeling met twee verschillende medicijnen. De eerste medicatie (de feitelijke abortuspil) wordt in abortuskliniek of ziekenhuis ingenomen; de tweede medicatie na 36 tot 48 uur thuis of in de instelling. Na twee tot drie weken volgt een nacontrole. De abortuspil is in Nederland geregistreerd tot negen weken amenorroeduur* en kan dus zowel bij de overtijdbehandeling* als bij een latere zwangerschapsafbreking als behandelingsmethode worden gekozen. De abortuspil is niet hetzelfde als de morning-afterpil*. In ziekenhuizen wordt de abortuspil ook off-label gebruikt na de zwangerschapsduur van 8 weken en 6 dagen.

Amenorroeduur

De periode verstreken sinds de eerste dag van de laatste menstruatie.

Beraadtermijn

Een zwangerschap mag niet eerder worden afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw een arts heeft bezocht en daarbij haar voornemen met de arts heeft besproken (Wafz, artikel 3 lid 1). De beraadtermijn geldt niet voor de overtijdbehandeling*. Per 1 januari 2023 is deze wettelijke verplichting komen te vervallen.

Besluit afbreking zwangerschap (Bafz)

Algemene Maatregel van Bestuur waarin voorschriften zijn opgenomen voor de uitvoering van de Wet afbreking zwangerschap*.

Buitenlandse vrouwen

Categorie vrouwen zonder Nederlandse zorgverzekering, denk aan buitenlandse vrouwen die voor een abortus naar Nederland afreizen, arbeidsmigranten of buitenlandse studenten. Vooral nog is aparte registratie niet mogelijk voor vrouwen woonachtig op de BES eilanden, zij worden tot op heden geregistreerd bij de optie 'ander land' en vallen daardoor volledig in de categorie 'buitenlandse vrouwen'.

Eerste trimester zwangerschapsafbreking

Zwangerschapsafbreking tot en met een amenorroeduur van 12 weken en 6 dagen*. Abortusklinieken en ziekenhuizen met een Wafz-vergunning kunnen, met inachtneming van de beraadtermijn*, eerste trimester zwangerschapsafbrekingen uitvoeren.

Late zwangerschapsafbreking

Afbreking van de zwangerschap vanaf 24 weken amenorroeduur*. Deze afbrekingen worden gemeld en beoordeeld binnen de [Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen](#) (LZALP).

Morning-aftermethoden

De morning-afterpil (werkzaam bij inname tot uiterlijk 72 uur na onbeschermd geslachtsgemeenschap) veroorzaakt uitstel of blokkering van de eisprong en innesteling en voorkomt daarmee conceptie. De morning-afterpil is sinds 2004 zonder recept verkrijgbaar bij apotheek en drogist. De morning-afterspiraal (tot uiterlijk 5 dagen na onbeschermd geslachtsgemeenschap) voorkomt innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoeder. Deze morning-aftermethoden vallen *niet* onder de Wafz (Wafz, artikel 1 lid 2) en zijn niet in de abortusregistratie opgenomen. De morning-afterpil wordt vaak met 'abortuspil'* en 'overtijdbehandeling'* verward.

Overtijdbehandeling (otb)

Vroege zwangerschapsafbreking, tot 16 dagen 'overtijd' (amenorroeduur* 44 dagen), instrumenteel of met abortuspil* niet te verwarren met 'morning-aftermethoden'*. Indertijd, bij het ontwerpen van de Wafz, kon in deze 'overtijdperiode' een zwangerschap nog niet met zekerheid worden vastgesteld, waardoor onbekend bleef of een zogeheten overtijdbehandeling (ook wel 'menstruatieregeling' genoemd) daadwerkelijk een zwangerschap afbrak. De overtijdbehandeling valt daarom niet onder de Wafz en kent daardoor geen verplichte beraadtermijn*. Een overtijdbehandeling mag alleen in een ziekenhuis of abortuskliniek met Wafz-vergunning worden verricht.

Tweede trimester zwangerschapsafbreking

Zwangerschapsafbreking vanaf een amenorroeduur* van 13 weken en 0 dagen tot aan de levensvatbaarheidsgrens. Voor het verrichten van tweede trimesterzwangerschapsafbrekingen stellen de Wafz en het Bafz extra eisen aan de abortusklinieken, die daarvoor een aparte vergunning moeten hebben.

Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

De Wet afbreking zwangerschap, 'houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap' werd in 1981 door de Eerste Kamer aangenomen en trad in 1984 in werking.

Bijlage 2 - Aantal zwangerschapsafbrekingen

Naar woonland cliënt en aantal apart opgegeven overtijdbehandelingen 1980 – 2022.

Tabel A: Zwangerschapsafbrekingen naar herkomst cliënt

Aantal zwangerschapsafbrekingen naar herkomst cliënten, uitgesplitst naar woonland, in aantallen, in de periode 1980-2022.

| Land van vestiging | 1980 * | 1985 ** | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 *** | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nederland | 19.700 | 17.251 | 18.384 | 20.932 | 27.205 | 28.738 | 28.319 | 26.916 | 28.532 | 28.089 | 32.339 |
| België/ (Luxemburg) | 7.100 | 5.044 | 3.524 | 2.247 | 1.473 | 913 | 803 | 530 | 330 | 371 | 452 |
| Duitsland ¹ | 26.200 | 8.297 | 6.517 | 2.982 | 1.603 | 1.148 | 1.123 | 1.146 | 1.125 | 1.011 | 1.256 |
| Frankrijk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.348 | 590 | 501 | 411 |
| Ierland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 9 | 41 | 13 |
| Polen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227 | 308 | 656 | 630 |
| Spanje ² | -- | 6.344 | 313 | 242 | 7 | 12 | 18 | -- | -- | -- | -- |
| Overige landen | 3.400 | 966 | 1.498 | 2.236 | 3.038 | 2.167 | 2.111 | 597 | 456 | 374 | 496 |
| Onbekend | -- | 40 | 6 | 46 | 9 | 4 | 53 | 5 | 14 | 6 | 9 |
| <i>Totaal</i> | <i>56.400</i> | <i>37.972</i> | <i>30.242</i> | <i>28.685</i> | <i>33.335</i> | <i>32.982</i> | <i>32.427</i> | <i>30.803</i> | <i>31.364</i> | <i>31.049</i> | <i>35.606</i> |

* 1980: Bron Stimezo Nederland 1984 (door Stimezo geregistreerde aantallen van de abortusklinieken en de geschatte aantallen van de ziekenhuizen)

** vanaf 1985: Uit wettelijk verplichte abortusregistratie (inclusief apart opgegeven overtijdbehandelingen, zie hoofdstuk 3.3)

*** Voor gebruik gegevens 2009 in plaats van 2010: zie hoofdstuk 1.3.

¹ Tot 1990: West-Duitsland

² In de – in 1984 wettelijk vastgestelde – registratieformulieren werden Duitsland, België/Luxemburg en Spanje gespecificeerd. Dit waren destijds de meest voorkomende landen. In de registratieformulieren die per 1 januari 2011 van kracht werden wordt België apart genoemd, zijn Frankrijk, Ierland en Polen toegevoegd en zijn Luxemburg en Spanje als aparte categorie afgevallen.

Tabel B: Overtijdbehandelingen

Aantal apart gemelde overtijdbehandelingen binnen totaal aantal zwangerschapsafbrekingen, in de periode 1990 – 2022.

| Jaar | Aantal overtijdbehandelingen | Percentage overtijdbehandelingen binnen totaal aantal zwangerschapsafbrekingen % |
|------|------------------------------|--|
| 1990 | 3.485 | 11,5 |
| 1995 | 3.498 | 12,2 |
| 2000 | 6.005 | 18,0 |
| 2005 | 6.311 | 19,1 |
| 2009 | 7.652 | 23,6 |
| 2014 | 8.229 | 27,1 |
| 2015 | 8.553 | 27,8 |
| 2020 | 9.903 | 31,6 |
| 2021 | 10.854 | 35,0 |
| 2022 | 12.299 | 34,5 |

Bijlage 3 - Abortuscijfer en abortusratio

Tabel C: Abortuscijfer

Aantal zwangerschapsafbrekingen (inclusief overtijdbehandelingen) per 1.000 vrouwen van 15 tot 44 jaar in Nederland woonachtig*, in de periode 1990-2022.

| Jaar | Aantal in Nederland wonende behandelde vrouwen | Abortuscijfer per 1.000 in Nederland wonende vrouwen |
|--------|--|--|
| 1990 | 18.384 | 5,2 |
| 1995 | 20.932 | 6,0 |
| 2000 | 27.205 | 8,0 |
| 2005 | 28.738 | 8,6 |
| 2010** | 26.724 | 8,7 |
| 2015 | 26.916 | 8,6 |
| 2020 | 28.532 | 8,9 |
| 2021 | 28.089 | 8,7 |
| 2022 | 32.339 | 9,9 |

* Gebaseerd op het aantal vrouwen 15-44 jaar volgens opgave Centraal Bureau voor de statistiek (van 1990 t/m 1995 gemiddeld over het jaar; van 1996 t/m 2009 op basis van peildatum 1 januari van het betreffende jaar, vanaf 2010 gemiddeld over het jaar).

** Gebaseerd op geschatte gegevens

Tabel D: Abortusratio

Aantal zwangerschapsafbrekingen (inclusief overtijdbehandelingen) per 1.000 levendgeborenen in de periode 1990-2022

| Aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 levendgeborenen | |
|---|-----|
| 1990 | 93 |
| 1995 | 110 |
| 2000 | 132 |
| 2005 | 153 |
| 2010* | 152 |
| 2015 | 158 |
| 2020 | 169 |
| 2021 | 157 |
| 2022 | 193 |

* Gebaseerd op geschatte gegevens

Bijlage 4 - Kenmerken vrouw

Zwangerschapsduur; leeftijd; aantal kinderen waarvoor zij zorg draagt; aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen.

Tabel E: Zwangerschapsduur

Zwangerschapsduur ten tijde van de afbreking in aantallen, naar ziekenhuis of kliniek, 2020 – 2022.

| Aantal weken | Ziekenhuizen | | | Klinieken (inclusief overtijdbehandelingen) | | | Totaal | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4 weken | 97 | 85 | 102 | 1.586 | 1.956 | 2.386 | 1.683 | 2.041 | 2.488 |
| 5 weken | 400 | 439 | 483 | 5.956 | 6.923 | 7.535 | 6.356 | 7.362 | 8.018 |
| 6 weken | 501 | 487 | 486 | 7.734 | 7.156 | 8.357 | 8.235 | 7.643 | 8.843 |
| 7 weken | 346 | 301 | 290 | 3.361 | 2.932 | 3.446 | 3.707 | 3.233 | 3.736 |
| 8 weken | 174 | 187 | 192 | 2.787 | 2.579 | 3.147 | 2.961 | 2.766 | 3.339 |
| 9 weken | 98 | 83 | 108 | 1.575 | 1.360 | 1.678 | 1.673 | 1.443 | 1.786 |
| 10 weken | 65 | 41 | 52 | 828 | 678 | 848 | 893 | 719 | 900 |
| 11 weken | 50 | 43 | 56 | 610 | 566 | 669 | 660 | 609 | 725 |
| 12 weken | 100 | 72 | 79 | 406 | 367 | 504 | 506 | 439 | 583 |
| 13 weken | 123 | 149 | 163 | 393 | 381 | 453 | 516 | 530 | 616 |
| 14 weken | 166 | 170 | 187 | 367 | 420 | 498 | 533 | 590 | 685 |
| 15 weken | 112 | 124 | 147 | 459 | 436 | 522 | 571 | 560 | 669 |
| 16 weken | 82 | 92 | 102 | 485 | 501 | 539 | 567 | 593 | 641 |
| 17 weken | 81 | 77 | 73 | 351 | 423 | 410 | 432 | 500 | 483 |
| 18 weken | 48 | 45 | 50 | 366 | 320 | 325 | 414 | 365 | 375 |
| 19 weken | 36 | 51 | 53 | 337 | 346 | 414 | 373 | 397 | 467 |
| 20 weken | 111 | 97 | 66 | 315 | 289 | 366 | 426 | 386 | 432 |
| 21 weken | 137 | 120 | 100 | 301 | 326 | 383 | 438 | 446 | 483 |
| 22 weken | 110 | 122 | 84 | 161 | 107 | 93 | 271 | 229 | 177 |
| 23 weken | 130 | 156 | 122 | 0 | 0 | 0 | 130 | 156 | 122 |
| Niet ingevuld | 14 | 14 | 25 | 5 | 28 | 13 | 19 | 42 | 38 |
| <i>Totaal</i> | <i>2.981</i> | <i>2.955</i> | <i>3.020</i> | <i>28.383</i> | <i>28.094</i> | <i>32.586</i> | <i>31.364</i> | <i>31.049</i> | <i>35.606</i> |

Tabel F: Leeftijd vrouw bij behandeling

Leeftijd van de vrouw bij de behandeling in aantallen, 2020 – 2022.

| Leeftijd | 2020 | 2021 | 2022 | 'abortuscijfer' per leeftijdscategorie 2022 |
|----------------|--------|--------|--------|---|
| < 15 jaar | 58 | 101 | 81 | - |
| 15 t/m 19 jaar | 2.297 | 2.282 | 2.621 | 5,23 |
| 20 t/m 24 jaar | 6.135 | 6.034 | 7.392 | 13,04 |
| 25 t/m 29 jaar | 7.688 | 7.171 | 8.215 | 14,59 |
| 30 t/m 34 jaar | 7.294 | 7.440 | 8.340 | 14,53 |
| 35 t/m 39 jaar | 5.410 | 5.489 | 6.115 | 11,31 |
| 40 t/m 44 jaar | 2.231 | 2.313 | 2.562 | 4,86 |
| ≥ 45 jaar | 242 | 217 | 267 | - |
| Niet ingevuld | 9 | 2 | 13 | - |
| <i>Totaal</i> | 31.364 | 31.049 | 35.606 | - |

Tabel G: Aantal kinderen vrouw

Aantal kinderen dat de vrouw heeft gekregen en/of waarvoor de vrouw zorg draagt in percentages van het totaal aantal behandelde vrouwen, 2020 – 2022.

| Aantal kinderen | 2020 (n = 31.364) % | 2021 (n = 31.049) % | 2022 (n = 35.606) % |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0 | 46,3 | 46,4 | 51,0 |
| 1 | 19,6 | 20,0 | 17,2 |
| 2 | 21,6 | 21,5 | 20,0 |
| 3 | 8,6 | 8,5 | 8,0 |
| 4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| 5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| >6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Tabel H: Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen

Aantal eerdere zwangerschapsafbrekingen, in percentages van behandelde vrouwen, 2020 – 2022.

| Aantal eerdere zwangerschapsonderbrekingen | 2020 (n = 31.364) % | 2021 (n = 31.049) % | 2022 (n = 35.606) % |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0 | 65,4 | 66,2 | 68,5 |
| 1 | 23,5 | 23,2 | 20,7 |
| 2 | 6,9 | 6,5 | 6,4 |
| 3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| >5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Niet ingevuld | 0,4 | 0,5 | 0,9 |

Bijlage 5 – Toegankelijkheid

Woonplaats cliënt naar provincie; aantal Wafz-vergunningen voor ziekenhuizen en klinieken; zwangerschapsafbrekingen naar provincie, trimester, ziekenhuis of kliniek, 2020 – 2022.

Tabel I: Woonplaats cliënt naar provincie

Woonplaats cliënten naar provincie, in percentages van behandelde vrouwen die in Nederland woonachtig waren, 2020 – 2022.

| Provincie | 2020 (n = 28.532) % | 2021 (n = 28.089) % | 2022 (n = 32.339) % | 'abortuscijfer' per provincie, 2022 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Groningen | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 8,6 |
| Friesland | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 7,0 |
| Drenthe | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 6,1 |
| Overijssel | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 6,9 |
| Gelderland | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 7,1 |
| Flevoland | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 14,7 |
| Utrecht | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 8,6 |
| Noord-Holland | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 23,0 |
| Zuid-Holland | 29,0 | 27,8 | 26,9 | 11,9 |
| Zeeland | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 8,2 |
| Noord-Brabant | 12,3 | 12,6 | 13,1 | 9,1 |
| Limburg | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 8,8 |

Tabel J: Aantal Wafz-vergunningen

Aantal Wafz-vergunningen voor ziekenhuizen en abortusklinieken (of ZBC) naar provincie op 31 december 2022.

| Provincie | Ziekenhuizen | Klinieken | Totaal |
|---------------|--------------|-----------|-----------|
| Groningen | 4 | 1 | 5 |
| Friesland | 4 | -- | 4 |
| Drenthe | 3 | -- | 3 |
| Overijssel | 5 | 2 | 7 |
| Gelderland | 10 | 1 | 11 |
| Flevoland | 1 | 1 | 2 |
| Utrecht | 4 | 1 | 5 |
| Noord-Holland | 13 | 7* | 20 |
| Zuid-Holland | 16 | 2 | 18 |
| Zeeland | 2 | 1 | 3 |
| Noord-Brabant | 10 | 3 | 13 |
| Limburg | 5 | 1 | 6 |
| BES-eilanden | 1 | -- | 1 |
| <i>Totaal</i> | <i>78</i> | <i>20</i> | <i>98</i> |

* daarnaast heeft Women on Waves voor haar zeiljacht 'Adelaide' een vergunning in het kader van de Wafz.

-- Geen abortuskliniek aanwezig

Tabel K: Aandeel tweede trimester behandelingen

Aandeel in tweede trimester behandelingen, naar ziekenhuizen en klinieken, 2011-2022*.

| Jaar | Ziekenhuizen | | Klinieken (inclusief overtijdbehandelingen) | | Totaal |
|------|--------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|
| | Aantal | % van totaal tweede trimesterabortus | Aantal | % van totaal tweede trimesterabortus | Aantal |
| 2011 | 813 | 13,0 | 5.422 | 87,0 | 6.235 |
| 2012 | 787 | 13,6 | 5.013 | 86,4 | 5.800 |
| 2013 | 842 | 14,6 | 4.927 | 85,4 | 5.769 |
| 2014 | 892 | 16,0 | 4.693 | 84,0 | 5.585 |
| 2015 | 924 | 16,1 | 4.807 | 83,9 | 5.731 |
| 2020 | 1.142 | 24,4 | 3.534 | 75,6 | 4.676 |
| 2021 | 1.210 | 25,4 | 3.549 | 74,6 | 4.759 |
| 2022 | 1.150 | 23,0 | 3.856 | 77,0 | 5.006 |

* In 2011 is de definitie van de termijnen aangescherpt

Tabel L: Zwangerschapsafbrekingen per provincie

Aantal zwangerschapsafbrekingen 2022 per provincie, naar ziekenhuis of kliniek, met vermelding van aantal tweede trimesterabortussen en apart opgegeven overtijdbehandelingen.

| Provincie | Ziekenhuizen | | Klinieken (inclusief overtijdbehandelingen) | | | Totaal | |
|---------------|--------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|
| | Totaal | Waarvan 2 ^e trimester | Totaal | Waarvan 2 ^e trimester | Waarvan otb | Totaal | Waarvan 2 ^e trimester |
| Groningen | 49 | 32 | 1.367 | 0 | 780 | 1.416 | 32 |
| Friesland | 156 | 15 | -- | -- | -- | 156 | 15 |
| Drenthe | 67 | 8 | -- | -- | -- | 67 | 8 |
| Overijssel | 102 | 88 | 2.208 | 0 | 964 | 2.310 | 88 |
| Gelderland | 157 | 146 | 2.217 | 159 | 1.076 | 2.374 | 305 |
| Flevoland | 498 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 1.963 | 0 |
| Utrecht | 155 | 138 | 3.215 | 1.040 | 0 | 3.370 | 1.178 |
| Noord-Holland | 1.044 | 235 | 8.223 | 2.097 | 4.071 | 9.267 | 2.332 |
| Zuid-Holland | 434 | 268 | 7.215 | 201 | 2.095 | 7.649 | 469 |
| Zeeland | 6 | 4 | 518 | 0 | 0 | 524 | 4 |
| Noord-Brabant | 148 | 140 | 4630 | 196 | 3.027 | 4.778 | 336 |
| Limburg | 80 | 68 | 1.528 | 163 | 286 | 1.608 | 231 |
| BES-eilanden | 124 | 8 | -- | -- | -- | 124 | 8 |

-- Geen abortuskliniek aanwezig

Bijlage 6 – Besluitvorming

Prenatale diagnostiek; Verwijspatroon; overleg deskundigen; beraadtermijn in dagen.

Tabel M: Prenatale diagnostiek

| Abortus (mede) naar aanleiding van prenatale diagnostiek | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| In abortusklinieken | 332 | 944 | 434 |
| In ziekenhuizen | 1.171 | 1.189 | 1.169 |
| <i>Totaal</i> | <i>1.503 (7,00%)</i> | <i>2.133 (10,56%)</i> | <i>1.603 (6,88%)</i> |

Sinds 2011 wordt via het Modelformulier van de Wafz-registratie een eventuele relatie tussen de zwangerschapsafbreking en prenatale diagnostiek geregistreerd met de vraag: 'Hebben de resultaten van prenatale diagnostiek een reden voor de vrouw gevormd om te kiezen voor zwangerschapsafbreking?'. Door de aard van de registratie is niet te bepalen of dit in het eerste of in het tweede trimester was. Ook de diagnoses bij de prenatale diagnostiek zijn niet in de Wafz-registratie opgenomen.

Tabel N: Verwijspatroon

Verwijspatroon, in percentages van behandelde vrouwen, 2020 – 2022.

| 2022 | Ziekenhuis (n= 3.178) % | Kliniek excl otb (n= 19.869) % | Kliniek otb (n= 9.186) % | Kliniek totaal (n= 29.055) % | Totaal (n=32.233) % |
|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Niet verwezen | 13,3 | 31,1 | 58,0 | 41,3 | 38,9 |
| Huisarts | 46,6 | 54,5 | 39,7 | 48,9 | 48,7 |
| Andere abortuskliniek | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 1,2 | 1,1 |
| Arts tweede of derde lijn | 13,2 | 11,5 | 0,6 | 7,4 | 7,9 |
| Andere verwijzer | 25,3 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 2,6 |
| Niet ingevuld | 1,2 | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |

| 2021 | Ziekenhuis (n= 2.955) % | Kliniek excl otb (n= 17.240) % | Kliniek otb (n= 10.854) % | Kliniek totaal (n= 28.094) % | Totaal (n=31.049) % |
|------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Niet verwezen | 17,0 | 31,6 | 57,5 | 41,6 | 39,2 |
| Huisarts | 42,0 | 52,0 | 40,5 | 47,5 | 47,0 |
| Andere abortuskliniek | 0,8 | 2,2 | 0,3 | 1,5 | 1,4 |
| Arts tweede of derde lijn | 12,4 | 13,4 | 0,5 | 8,4 | 8,8 |
| Andere verwijzer | 27,4 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 3,1 |
| Niet ingevuld | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |

| 2020 | Ziekenhuis (n= 2.981) % | Kliniek excl otb (n= 18.480) % | Kliniek otb (n= 9.903) % | Kliniek totaal (n= 28.383) % | Totaal (n=31.364) % |
|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Niet verwezen | 15,1 | 29,4 | 56,4 | 38,8 | 36,6 |
| Huisarts | 45,5 | 56,2 | 42,9 | 51,6 | 51,0 |
| Andere abortuskliniek | 0,5 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 1,1 |
| Arts tweede of derde lijn | 12,2 | 12,1 | 0,5 | 8,0 | 8,4 |
| Andere verwijzer | 26,5 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 2,9 |
| Niet ingevuld | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Tabel O: Overleg met andere deskundige

Overleg van de vrouw met andere deskundige naast de verwijzend of behandelend arts, in percentages van behandelde vrouwen, 2022*.

| 2022 | Ziekenhuis (n = 3.020) % | Kliniek (n = 32.586) % | Totaal (n = 35.606) % |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Maatschappelijk werker | 12,9 | 0,6 | 1,7 |
| Psycholoog/psychiater | 1,5 | 0,3 | 0,4 |
| Geestelijk raadspersoon | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Klinisch genetisch centrum | 18,1 | 0,1 | 1,6 |
| (Academisch) perinataal centrum | 11,2 | 0,0 | 1,0 |
| Andere deskundige | 3,4 | 0,3 | 0,5 |
| Geen nader overleg | 65,9 | 98,7 | 95,9 |

* Meerdere antwoorden mogelijk

Tabel P: Aantal dagen beraadtermijn

Aantal dagen beraadtermijn, in percentages van behandelde vrouwen, 2020 – 2022.

| Aantal dagen | 2020 (n=9.903 + 21.461) | | 2021 (n=10.854 + 20.195) | | 2022 (n=12.299 + 23.276) | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | Overtijd-behandeling % | Zwangerschaps-afbrekingen excl otb % | Overtijd-behandeling % | Zwangerschaps-afbrekingen excl otb % | Overtijd-behandeling % | Zwangerschaps-afbrekingen excl otb % |
| 0 dagen | 45,1 | 1,3 | 49,5 | 2,2 | 50,2 | 2,6 |
| 1 dag | 3,6 | 0,6 | 3,5 | 0,7 | 3,4 | 0,9 |
| 2 dagen | 2,4 | 0,6 | 2,4 | 0,6 | 2,5 | 0,6 |
| 3 dagen | 2,7 | 0,4 | 2,9 | 0,5 | 3,0 | 0,6 |
| 4 dagen | 2,5 | 0,6 | 3,1 | 0,7 | 2,1 | 0,6 |
| 5 dagen | 4,3 | 1,8 | 5,6 | 1,9 | 3,2 | 1,8 |
| 6 dagen | 8,6 | 24,8 | 8,4 | 28,2 | 6,3 | 22,6 |
| 7 dagen | 9,7 | 18,5 | 7,5 | 16,9 | 8,0 | 15,3 |
| 8 dagen | 5,8 | 9,8 | 4,9 | 9,9 | 5,1 | 8,9 |
| 9 dagen | 3,6 | 6,4 | 3,3 | 6,0 | 3,2 | 6,6 |
| 10 dagen | 2,4 | 5,7 | 2,2 | 4,5 | 2,8 | 5,5 |
| > 10 dagen | 9,3 | 29,5 | 6,9 | 27,7 | 10,2 | 34,0 |

Bijlage 7 – Behandeling

Behandelmethode; gebruik van anesthesie; complicaties.

Tabel Q: Behandelmethode

Behandelmethode, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen en naar ziekenhuis en kliniek 2020 – 2022.

| 2022 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---|--------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| Medicamenteus | 2.683 | 88,8 | 3.199 | 15,8 | 7.247 | 58,9 | 10.446 | 32,1 | 13.129 | 36,9 |
| Instrumenteel | 162 | 5,4 | 609 | 3,0 | 797 | 6,5 | 1.406 | 4,3 | 1.568 | 4,4 |
| Combinatie (medicamenteuze voorbehandeling) | 159 | 5,3 | 16.479 | 81,2 | 4.255 | 34,6 | 20.734 | 63,6 | 20.893 | 58,7 |
| Anders | 11 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 0,0 |
| Niet ingevuld | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| <i>Totaal</i> | <i>3.020</i> | <i>-</i> | <i>20.287</i> | <i>-</i> | <i>12.299</i> | <i>-</i> | <i>32.586</i> | <i>-</i> | <i>35.606</i> | <i>-</i> |

| 2021 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---|--------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| Medicamenteus | 2.619 | 88,6 | 2.362 | 13,7 | 5.683 | 52,4 | 8.045 | 28,6 | 10.664 | 34,3 |
| Instrumenteel | 165 | 5,6 | 282 | 1,6 | 637 | 5,9 | 919 | 3,3 | 1.084 | 3,5 |
| Combinatie (medicamenteuze voorbehandeling) | 159 | 5,4 | 14.596 | 84,7 | 4.534 | 41,8 | 19.130 | 68,1 | 19.289 | 62,1 |
| Anders | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| Niet ingevuld | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| <i>Totaal</i> | <i>2.955</i> | <i>-</i> | <i>17.240</i> | <i>-</i> | <i>10.854</i> | <i>-</i> | <i>28.094</i> | <i>-</i> | <i>31.049</i> | <i>-</i> |

| 2020 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---|--------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| Medicamenteus | 2.552 | 85,6 | 2.083 | 11,3 | 5.115 | 51,7 | 7.198 | 25,4 | 9.750 | 31,1 |
| Instrumenteel | 194 | 6,5 | 1.464 | 7,9 | 730 | 7,4 | 2.194 | 7,7 | 2.388 | 7,6 |
| Combinatie (medicamenteuze voorbehandeling) | 207 | 6,9 | 14.933 | 80,8 | 4.058 | 41,0 | 18.991 | 66,9 | 19.198 | 61,2 |
| Anders | 20 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 0,1 |
| Niet ingevuld | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| <i>Totaal</i> | <i>2.981</i> | <i>-</i> | <i>18.480</i> | <i>-</i> | <i>9.903</i> | <i>-</i> | <i>28.383</i> | <i>-</i> | <i>31.364</i> | <i>-</i> |

Tabel R: Gebruik van anesthesie

Gebruik van anesthesie tijdens de behandeling, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen en naar ziekenhuis en kliniek 2020 – 2022.

| 2022 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---------------|--------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| Geen | 2.084 | 69,0 | 3.077 | 15,2 | 7.248 | 58,9 | 10.325 | 31,7 | 12.409 | 34,9 |
| Lokaal | 169 | 5,6 | 1.501 | 7,4 | 1.237 | 10,1 | 2.738 | 8,4 | 2.907 | 8,2 |
| Intraveneus | 470 | 15,6 | 15.377 | 75,8 | 3.814 | 31,0 | 19.191 | 58,9 | 19.661 | 55,2 |
| Combinatie | 11 | 0,4 | 214 | 1,1 | 0 | 0,0 | 214 | 0,7 | 225 | 0,6 |
| Anders* | 205 | 6,8 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 206 | 0,6 |
| Niet ingevuld | 81 | 2,7 | 117 | 0,6 | 0 | 0,0 | 117 | 0,4 | 198 | 0,6 |
| <i>Totaal</i> | <i>3.020</i> | <i>-</i> | <i>20.287</i> | <i>-</i> | <i>12.299</i> | <i>-</i> | <i>32.586</i> | <i>-</i> | <i>35.606</i> | <i>-</i> |

* Onder andere: algehele narcose; epidurale of spinale anesthesie; PCA pomp

| 2021 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---------------|--------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| Geen | 2.020 | 68,4 | 2.114 | 12,3 | 5.685 | 52,4 | 7.799 | 27,8 | 9.819 | 31,6 |
| Lokaal | 170 | 5,8 | 1.522 | 8,8 | 1.460 | 13,5 | 2.982 | 10,6 | 3.152 | 10,2 |
| Intraveneus | 449 | 15,2 | 13.372 | 77,6 | 3.708 | 34,2 | 17.080 | 60,8 | 17.529 | 56,5 |
| Combinatie | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| Anders* | 245 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 245 | 0,8 |
| Niet ingevuld | 64 | 2,2 | 232 | 1,3 | 0 | 0,0 | 232 | 0,8 | 296 | 1,0 |
| <i>Totaal</i> | <i>2.955</i> | <i>-</i> | <i>17.240</i> | <i>-</i> | <i>10.854</i> | <i>-</i> | <i>28.094</i> | <i>-</i> | <i>31.049</i> | <i>-</i> |

* Onder andere: algehele narcose; epidurale of spinale anesthesie; PCA pomp

| 2020 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|---------------|--------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| Geen | 1.948 | 65,3 | 2.032 | 11,0 | 5.123 | 51,7 | 7.155 | 25,2 | 9.103 | 29,0 |
| Lokaal | 202 | 6,8 | 1.903 | 10,3 | 1.700 | 17,2 | 3.603 | 12,7 | 3.805 | 12,1 |
| Intraveneus | 523 | 17,5 | 14.481 | 78,4 | 3.080 | 31,1 | 17.561 | 61,9 | 18.084 | 57,7 |
| Combinatie | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| Anders* | 200 | 6,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 200 | 0,6 |
| Niet ingevuld | 100 | 3,4 | 64 | 0,3 | 0 | 0,0 | 64 | 0,2 | 164 | 0,5 |
| <i>Totaal</i> | <i>2.981</i> | <i>-</i> | <i>18.480</i> | <i>-</i> | <i>9.903</i> | <i>-</i> | <i>28.383</i> | <i>-</i> | <i>31.364</i> | <i>-</i> |

* Onder andere: algehele narcose; epidurale of spinale anesthesie; PCA pomp

Tabel S: Complicaties

Complicaties in aantallen* en percentages van behandelde vrouwen, 2022.

| 2022 | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|----------------------------------|--------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|
| Geen | 2.476 | 82,0 | 20.111 | 99,1 | 12.074 | 98,2 | 32.185 | 98,8 | 34.661 | 97,3 |
| Behandeld in eigen instelling | 468 | 15,5 | 148 | 0,7 | 217 | 1,8 | 365 | 1,1 | 833 | 2,3 |
| Verwezen naar (ander) ziekenhuis | 5 | 0,2 | 28 | 0,1 | 8 | 0,1 | 36 | 0,1 | 41 | 0,1 |
| Niet ingevuld | 71 | 2,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 71 | 0,2 |
| <i>Totaal</i> | <i>3.020</i> | <i>-</i> | <i>20.287</i> | <i>-</i> | <i>12.299</i> | <i>-</i> | <i>32.586</i> | <i>-</i> | <i>35.606</i> | <i>-</i> |

Indien complicatie is behandeld in eigen instelling*

| Complicatie | Ziekenhuis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|------------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|------------|----------|
| Bloedverlies >500 ml | 153 | 27,4 | 9 | 5,6 | 8 | 3,6 | 17 | 4,4 | 170 | 18,0 |
| Incomplete abortus | 272 | 48,7 | 123 | 75,9 | 199 | 89,6 | 322 | 83,9 | 594 | 63,1 |
| Letsel aan uterus | 1 | 0,2 | 13 | 8,0 | 1 | 0,5 | 14 | 3,6 | 15 | 1,6 |
| Infectie | 7 | 1,3 | 5 | 3,1 | 9 | 4,1 | 14 | 3,6 | 21 | 2,2 |
| Bijwerkingen medicatie | 5 | 0,9 | 4 | 2,5 | 2 | 0,9 | 6 | 1,6 | 11 | 1,2 |
| Andere complicatie | 120 | 21,5 | 8 | 4,9 | 3 | 1,4 | 11 | 2,9 | 131 | 13,9 |
| <i>Totaal</i> | <i>558</i> | <i>-</i> | <i>162</i> | <i>-</i> | <i>222</i> | <i>-</i> | <i>384</i> | <i>-</i> | <i>942</i> | <i>-</i> |

* Meerdere complicaties mogelijk per patiënt

De registratie van complicaties is niet verplicht conform de Wafz. Op het moment en op de plaats van registreren is informatie rondom een nog op te treden complicatie nog niet evident. Deze registratie geeft dus geen volledig beeld.

Bijlage 8 - Nazorg

Nacontrole; anticonceptiekeuze na behandeling.

Tabel T: Nacontrole

Nacontrole, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen, 2020 – 2022.

| 2022 | Zieken- huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|-------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|
| In behandel- centrum | 2.678 | 88,7 | 6.005 | 29,6 | 6.780 | 55,1 | 12.785 | 39,2 | 15.463 | 43,4 |
| Bij verwijzer | 45 | 1,5 | 11.034 | 54,4 | 3.318 | 27,0 | 14.352 | 44,0 | 14.397 | 40,4 |
| Elders | 4 | 0,1 | 2.193 | 10,8 | 1.417 | 11,5 | 3.610 | 11,1 | 3.614 | 10,1 |
| Geen nacontrole | 196 | 6,5 | 954 | 4,7 | 784 | 6,4 | 1.738 | 5,3 | 1.934 | 5,4 |
| Niet ingevuld* | 97 | 3,2 | 101 | 0,5 | 0 | 0,0 | 101 | 0,3 | 198 | 0,6 |
| <i>Totaal</i> | <i>3.020</i> | <i>-</i> | <i>20.287</i> | <i>-</i> | <i>12.299</i> | <i>-</i> | <i>32.586</i> | <i>-</i> | <i>35.606</i> | <i>-</i> |

| 2021 | Zieken- huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|-------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|
| In behandel- centrum | 2.588 | 87,6 | 5.291 | 30,7 | 5.580 | 51,4 | 10.871 | 38,7 | 13.459 | 43,3 |
| Bij verwijzer | 138 | 4,7 | 9.813 | 56,9 | 3.344 | 30,8 | 13.157 | 46,8 | 13.295 | 42,8 |
| Elders | 10 | 0,3 | 1.963 | 11,4 | 1.364 | 12,6 | 3.327 | 11,8 | 3.337 | 10,7 |
| Geen nacontrole | 180 | 6,1 | 124 | 0,7 | 566 | 5,2 | 690 | 2,5 | 870 | 2,8 |
| Niet ingevuld* | 39 | 1,3 | 49 | 0,3 | 0 | 0,0 | 49 | 0,2 | 88 | 0,3 |
| <i>Totaal</i> | <i>2.955</i> | <i>-</i> | <i>17.240</i> | <i>-</i> | <i>10.854</i> | <i>-</i> | <i>28.094</i> | <i>-</i> | <i>31.049</i> | <i>-</i> |

| 2020 | Zieken- huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|-------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|
| In behandel- centrum | 2.647 | 88,8 | 5.312 | 28,7 | 5.135 | 51,9 | 10.447 | 36,8 | 13.094 | 41,7 |
| Bij verwijzer | 92 | 3,1 | 11.352 | 61,4 | 3.711 | 37,5 | 15.063 | 53,1 | 15.155 | 48,3 |
| Elders | 6 | 0,2 | 1.439 | 7,8 | 697 | 7,0 | 2.136 | 7,5 | 2.142 | 6,8 |
| Geen nacontrole | 204 | 6,8 | 376 | 2,0 | 360 | 3,6 | 736 | 2,6 | 940 | 3,0 |
| Niet ingevuld* | 32 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 33 | 0,1 |
| <i>Totaal</i> | <i>2.981</i> | <i>-</i> | <i>18.480</i> | <i>-</i> | <i>9.903</i> | <i>-</i> | <i>28.383</i> | <i>-</i> | <i>31.364</i> | <i>-</i> |

Tabel U: Anticonceptie na behandeling

Anticonceptie na de behandeling, in aantallen en percentages van behandelde vrouwen, 2020 – 2022.

| 2022 | Zieken -huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|------------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|
| Anticonceptie voorgeschreven | 726 | 24,0 | 7.958 | 39,2 | 5.751 | 46,8 | 13.709 | 42,1 | 14.435 | 40,5 |
| Verwezen naar huisarts | 967 | 32,0 | 11.078 | 54,6 | 5.944 | 48,3 | 17.022 | 52,2 | 17.989 | 50,5 |
| Geen anticonceptie gewenst | 536 | 17,7 | 831 | 4,1 | 490 | 4,0 | 1.321 | 4,1 | 1.857 | 5,2 |
| Niet besproken | 622 | 20,6 | 182 | 0,9 | 55 | 0,4 | 237 | 0,7 | 859 | 2,4 |
| Niet ingevuld* | 169 | 5,6 | 238 | 1,2 | 59 | 0,5 | 297 | 0,9 | 466 | 1,3 |
| <i>Totaal</i> | <i>3.020</i> | <i>-</i> | <i>20.287</i> | <i>-</i> | <i>12.299</i> | <i>-</i> | <i>32.586</i> | <i>-</i> | <i>35.606</i> | <i>-</i> |

| 2021 | Zieken -huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|------------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|
| Anticonceptie voorgeschreven | 723 | 24,5 | 6.556 | 38,0 | 5.593 | 51,5 | 12.149 | 43,2 | 12.872 | 41,5 |
| Verwezen naar huisarts | 859 | 29,1 | 9.650 | 56,0 | 4.725 | 43,5 | 14.375 | 51,2 | 15.234 | 49,1 |
| Geen anticonceptie gewenst | 521 | 17,6 | 748 | 4,3 | 471 | 4,3 | 1.219 | 4,3 | 1.740 | 5,6 |
| Niet besproken | 733 | 24,8 | 121 | 0,7 | 34 | 0,3 | 155 | 0,6 | 888 | 2,9 |
| Niet ingevuld* | 119 | 4,0 | 165 | 1,0 | 31 | 0,3 | 196 | 0,7 | 315 | 1,0 |
| <i>Totaal</i> | <i>2.955</i> | <i>-</i> | <i>17.240</i> | <i>-</i> | <i>10.854</i> | <i>-</i> | <i>28.094</i> | <i>-</i> | <i>31.049</i> | <i>-</i> |

| 2020 | Zieken -huis | % | Kliniek excl otb | % | Kliniek otb | % | Kliniek totaal | % | Totaal | % |
|------------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|
| Anticonceptie voorgeschreven | 797 | 26,7 | 7.440 | 40,3 | 4.847 | 48,9 | 12.287 | 43,3 | 13.084 | 41,7 |
| Verwezen naar huisarts | 780 | 26,2 | 10.496 | 56,8 | 4.719 | 47,7 | 15.215 | 53,6 | 15.995 | 51,0 |
| Geen anticonceptie gewenst | 608 | 20,4 | 470 | 2,5 | 282 | 2,8 | 752 | 2,6 | 1.360 | 4,3 |
| Niet besproken | 653 | 21,9 | 68 | 0,4 | 25 | 0,3 | 93 | 0,3 | 746 | 2,4 |
| Niet ingevuld* | 143 | 4,8 | 6 | 0,0 | 30 | 0,3 | 36 | 0,1 | 179 | 0,6 |
| <i>Totaal</i> | <i>2.981</i> | <i>-</i> | <i>18.480</i> | <i>-</i> | <i>9.903</i> | <i>-</i> | <i>28.383</i> | <i>-</i> | <i>31.364</i> | <i>-</i> |

Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk

www.igj.nl